




OFICIUL FITOSANITAR GORJ
Tg Jiu, Bd. E. Teodoroiu, nr. 521
Nr. 116 /OF /03.02.2022



tel : 0253249043
fax: 0253249043
mail: dfggorj@yahoo.com

BULETIN DE AVERTIZARE Nr.2 din 03 .02 2022

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare in perioada repausului vegetativ ,cand conditiile meteorologice sunt prielnice : temperatura peste 5 grade Celsius,zile insorite ,fara vant,scoarta pomilor,arbustilor(fructiferi sau ornamentali) a speciilor pomicole si dendrologice din pepiniere trebuie sa fie uscata, fara chiciura si gheata se recomanda un tratament fitosanitar la urmatoarele grupe de plante sau culturi :

POMI FRUCTIFERI(SEMINTOASE –SAMBUROASE),ARBUSTI, PEPINIERE POMICOLE SI DENDROLOGICE ,VITA DE VIE

Pentru prevenirea si combaterea daunatorilor din rezerva biologica :paduchele din San Jose (Quadraspidotus perniciosus),paduchele testos (Parthenolecanium corni),oua de afide (Aphis spp.),acarieni (Tetranychus si Panonychus ulmi),paduchele lanos (Eriosoma lanigerum) ,psylide se recomanda executarea tratamentului numai pe parcelele pe care a fost confirmata prezenta acestora.Imediat dupa efectuarea lucrarilor de taiere (rarire si fructificare) se recomanda efectuarea tratamentului fitosanitar prin imbaierea foarte buna a pomilor ,arbustilor si speciilor din pepiniere. Pentru focul bacterian al rozaceelor boala produsa de ag.patogen (Erwinia amylovora)se face taierea ramurilor cu simptom la circa 50 cm sub limita prezentei simptomelor,iar intregul material vegetal va fi strans si distrus prin ardere.Unelte de lucru (foarfeci ,fierastrau)vor fi dezinfectate dupa fiecare utilizare cu solutie cuprica 3% sau hipoclorit de sodiu conc.1% Ulceratiile de pe trunchi vor fi inlaturate inclusiv o parte de 2 cm din tesutul ce inconjoara ulceratia si rana se dezinfecteaza cu 1% oxicleorura de cupru- lucrare ce se face inainte de taierile propriu-zise din livada pentru a se evita raspandirea infectiei la alte specii din jur.Se recomanda folosirea unuia din produsele de mai jos:

1) Tratament cu produse pe baza cuprice(stropirea albastra);

*-BOUILLIE BORDELAISE WDG = 0,5%

(5kg/ha samburoase si alte specii la 1000 litri apa si 7,5kg/ha la semintoase / 1500 litri apa) sau

* ALCUPRAL 50 PU =0,2% (2kg/ha/1000 L apa) si 0,3% semintoase(4,5 kg/ha/1500 l apa

2) Tratamentul se aplica la 12-14 zile de la cel cu cuprice;

* JUVINAL 10EC =0,1% sau

*MOSPILAN 20 SP(KRIMA 20 SG a doua denumire)=0,450kg/ha + TOIL =0,5% adjuvant pr baza de ulei sau

*OVIPRON TOP(VERNOIL a doua denumire comerciala) =2500ml/100 litri apa sau 1500 ml /100litri apa in amestec cu insecticide

Puteti folosi si alte produse pentru protectia plantelor omologate,peu a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Masuri alternative de combatere: mecanice ;fizice; biologice;

Metode durabile; biologice,fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice,daca acestea asigura un control corespunzator al organismelor daunatoare.

Verificati,cu mare atentie,recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!

Luati masurile ce se impu pentru protectia mediului inconjurator!

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,manusi) la manuirea produselor de protectia plantelor.

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementareaAgenția Națională Fitosanitară și Asociatia Crescatorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicatiilor cu ppp. Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltatii rurale nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale,al ministrului mediului,apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania ,cu modificarile ulterioare.**

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină dupa urmatorul model:

FERMIER (S.C.,I.L.,A.F.)-----

Sediul(adresa) -----

Ferma(sediul) -----

REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR

Data efectuării tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recolta rii produsului agricol	Nr. si Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folo-sita	Su pra fat a (ha)	Cantitate Utilizate (kg,l)			