

Nr. 316/ data 14.04.2025

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr .11 din 14.04.2025****„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”**

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea buruienilor, bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante la următoarele culturi de cereale paioase:

GRAU, ORZ ,ORZOAICA,OVAZ SI TRITICALE

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: infestarea culturii cu buruieni mono și dicotiledonate anuale și perene ,boli foliare. Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele de protecție a plantelor -erbicide, după caz:

- DICOPUR TOP 464 SL (CEREDIN FORTE 464 SL) =0,8 - 1 l/ha sau
- DICOPUR M = 1 l/ha sau
- ATLANTIS FLEX = 0,2 l/ha -0,33 l/ha (în funcție de gradul de îmburuienare și buruienile rezistente- (iarba vantului ,odos ,coada vulpii,musetel se va da doza maxima) sau
- GRANSTAR SUPER 50 SG (CAMEO MAX) = 40 g /ha când e deficit hidric se aplică adjuvant TREND în doza 250 ml /ha se aplică de la înfrățit până la apariția frunzei stindard iar apa se va folosi 500 l/ha) sau
- HELMSTAR 75 WG (TRIMEO) =10-20 g /ha (15-20 g/ha la grau ,triticale- și 10 -15 g/ha la orz)

Dacă în cultura și-au făcut apariția bolile foliare(fainare,rugini,fuzarioza complexul de daunatori (mustele cerealelor și paduchele verde al cerealelor) atunci concomitent cu erbicidatul puteți aplica pentru infecția primară la boli și prezenta daunătorilor următoarele amestecuri:

KING 250 EW =0,5 L/HA + DELTAGRI=0,3 L/HA sau
NATIVO 300SC(TWIST PLUS)=0,8 L/HA +CYCLONE(FASTER GOLD 50 EC)=0,1 L/HA sau
FALCONE PRO (IMPULSE PRO 425 EC=0,6.l/HA + REXARIS 25 WG =0,3 KG/HA

Perioada optimă de tratament: înfrățire paioaselor până la formarea primului internod și altele până la apariția frunzei stindard iar palamida să nu depășească 10 -15 cm înălțime.
Cantitatea de apă folosită la hectar variază între 200-400 l .

. *SE VA RESPECTA CU STRICTETE PERIOADA DE ERBICIDARE RECOMANDATA A PRODUSULUI FOLOSIT.
Se vor folosi numai produse de protecția plantelor omologate.

Citiți cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați.Referințe :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastezi la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest și dai căutare în PEST-EXPERT..Folosiți echipament de protecție (halat,ochelari,manusi,manusi) la manuirea produselor de protecția plantelor.

Nu deversați soluțiile de stropit pe sol ,langa cursuri de apă,canale de scurgere ,suprafețe de beton.
Aplicați tratamentul în condiții favorabile fără vânt și ploie cu temperaturi pozitive peste 8 -10 grade Celsius..Clătiți de 3 ori recipientele și livrați ambalajele la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora <program SCAPA >accesati www.aiprom.ro.

. Luați măsuri pentru protecția mediului, a animalelor, respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de sănătate și securitate în muncă. Sa. respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricolă conform „ Ghidului de bune practici

de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara,
Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>."Se vor respecta cu strictete cerintele de agromediu,clima ,sol si silvomediu conform normelor Programului de Dezvoltare Rurala masurile(M10,M11,M13,M15).

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA,Ord. nr. 68/1992 al M.Mediului, Ord. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,Ord. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si Ord. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii complete cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitară si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (nr.103 /21.10.2016 ` privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.
Atentionare!

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină dupa urmatorul model:

FERMIER (S.C.;A.F; I.I)-----

Sediul(adresa)-----

Ferma-----

REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR

Data efectuarii tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura Si locul unde este situat terenul	Timpul aplicarii	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recoltarii produsului agricol	Nr. si Data Documentului prin care s-a dat in consum populatiei
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Suprafata (ha)	Cantitate Utilizate (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numereaza paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii .

COORDONATOR
CROITORU Dorin Catalin

INTOCMIT
UNGUREANU C-TINA