

OFICIUL FITOSANITAR GORJ
Tg Jiu, Bd. E. Teodoroiu, nr. 521
Nr. 587 / O/06.06.2022

tel : 0253249043
fax: 0253249043
mail:dfggorj@yahoo.com

BULETIN DE AVERTIZARE

NR. 27 din 06..06. 2022

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunatorilor care pot cauza pierderi importante în culturile de :

FASOLE



Gargarita fasolei



Bacterioza fasolei

Boli : arsura comună (*Xanthomonas phaseoli*), bacterioza fasolei (*Colletotrichum obtectus*)

Daunatori : paduchele negru (*Aphis fabae*), gargarita fasolei (*Acanthoscelides obtectus*).

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

- boli infecție primară
- prezența daunatorilor

Folositi unul din produse de protecția plantelor sau amestecurile următoare după caz :

-MERPAN 80 WDG = 0,15 % (0,9 kg/ha în 600 l apă) + DELTAM = 5ml /10 l apă la 100 mp
-BOUILLE BORDELAISE WDG = 0,75 % + MOVENTO 100 SC = 0,75 L/HA sau

ALCUPRAL 50 PU = 2,5 kg/ha + FASTER 10 CE = 0,1 L/HA

Aplicati tratamentul imediat când sunt condiții favorabile de temperatură, fără ploi, zile calme fără vânt pentru a reduce la minim riscul de a ajunge soluția pe culturile din jur.

Perioada optimă de tratament : -- tratamentul I înainte de înflorit

gargarita fasolei. -- tratamentul II la începutul formării pastailor acesta combate

-tratamentul III se aplică la 10-12 zile de la trat II faza ce coincide cu o ușoară îngălbenire a pastailor.